

## **DESCENSO TESTICULAR LAPAROSCÓPICO**

### **En qué Consiste:**

Procedimiento quirúrgico de exploración abdominal, mediante la insuflación de aire en la cavidad abdominal y visualización con telescopio de toda la cavidad abdominal. La intervención precisa anestesia general, que le será informada por el Servicio de Anestesia.

A través de esta técnica se pueden efectuar diferentes procedimientos quirúrgicos según el diagnóstico pre e intraoperatorio. En el caso que el diagnóstico pre operatorio sea testículo no palpable, se puede efectuar:

1. Exploración abdominal laparoscópica y encontrar ausencia de testículo: en este caso se pone fin al procedimiento.
2. Encontrar vasos testiculares entrando a orificio inguinal: en este caso se efectúa disección inguinal.
3. Encontrar testículo muy alto: en este caso se decide colocar clip a vasos espermáticos y esperar 6 meses.
4. Encontrar testículo cercano al orificio inguinal: en este caso se procede a descenderlo al escroto.

### **Qué Riesgos Tiene:**

Existe la posibilidad, según evolución y hallazgo operatorio, la conversión a cirugía abierta.

Las eventuales complicaciones son particulares a cada procedimiento, dentro de las complicaciones generales puede haber infecciones, sangramientos y perforación de vísceras.

**RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE  
Y QUEREMOS DARLE EL MEJOR  
CUIDADO, CONSULTE CON SU MÉDICO**