

HISTEROSALPINGOGRAFIA

Examen realizado mediante el uso de equipo de Rayos X que disponga de radioscopia para visualizar las estructuras contrastadas durante el examen y poder obtener adecuadas placas para el posterior informe radiológico. Este examen se realiza para estudio de infertilidad y poder así demostrar eventual patología del útero y trompas mediante el uso de medio de contraste yodado, no iónico mediante uso de una cánula colocada en el cuello uterino. Esta cánula ocasionalmente produce pequeñas erosiones en el cuello uterino que puede producir un pequeño sangramiento posterior al examen como el último día de su regla. Permite el diagnóstico de patología tumoral, inflamatoria u obstructiva del aparato reproductor femenino. Este examen requiere seguridad de no haber embarazo por lo cual se realiza durante los primeros 10 días a contar del inicio del período menstrual.

El examen demora aproximadamente 30 minutos. El paciente debe concurrir al Servicio de Rayos en la hora indicada. La paciente será colocada en la mesa de examen en posición ginecológica para la administración del medio de contraste a través de la cánula insertada en el cuello uterino mediante la ayuda de un espéculo colocado en la vagina. Posterior a la administración de contraste se obtendrán placas en proyecciones ántero-posterior y oblicuas. Posterior al examen y debido al paso de medio de contraste hacia la cavidad peritoneal la paciente pudiera tener algunas molestias menores a nivel de la pelvis que seden rapidamente debido a la absorción del medio de contraste. Para la visualización de estas estructuras también existe la posibilidad de realizar ecotomografía ginecológica, la que si bien es cierto permite la visión de las estructuras sólidas usando como ventana la vejiga no permite la visualización de la cavidad endometrial ni de las trompas.

El medio de contraste yodado puede producir cuadros alérgicos que en el caso nuestro están reducidos por el uso de contraste no iónico. Los problemas alérgicos pueden ir desde una simple picazón o rush cutáneo hasta problemas mayores que pueden requerir hospitalización. Esta posibilidad es difícil que ocurra en pacientes sin antecedentes previos pero de ocurrir es de una frecuencia muy despreciable (menos del 1%).

Este examen debe ser autorizado por Ud. como paciente y debe firmar el consentimiento informado que se adjunta.