

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE BLOQUEO FACETARIO

Información General

El bloqueo facetario lumbar es un procedimiento diagnóstico- terapéutico, que se realiza en paciente que presenta un cuadro de dolor lumbar de origen facetario (articulación de la vertebra), que no responden al manejo médico habitual.

El diagnóstico debe estar confirmado con estudio imagenológico, idealmente con scanner o tomografía axial computada (TAC) o Resonancia magnética, para que se certifique la correlación clínica e imagenológica y se descarten otras causas de dolor (por ejemplo infecciones, tumores).

Procedimiento

Se realiza en pabellón, bajo anestesia local y sedación. Con técnica estéril y controlando el proceso bajo intensificador de imágenes (equipo de rayos). Se colocan agujas en 3 articulaciones facetarias lumbares, dorsales o cervicales bilaterales. A través de esta se coloca una mezcla de corticoide + anestésico local. Siempre existe la posibilidad que durante el procedimiento, se puedan realizar modificaciones por hallazgos intraoperatorios, con el fin de proporcionar un tratamiento más adecuado.

El efecto analgésico puede ser por días, semanas o meses, este tiempo es variable y no se puede predecir.

Alternativa de Tratamiento

Como tratamiento alternativo al Bloqueo facetario lumbar, se puede mantener con kinesioterapia y ejercicios controlados, manejo analgésico o antiinflamatorios, ortesis lumbares, Tens (estimulación eléctrica transcutánea), inyección analgésica en puntos de dolor.

Riesgos del Procedimiento

A pesar de una adecuada técnica y realización del procedimiento, pueden presentarse efectos no deseados, ya que todo acto médico tiene riesgos. En la mayor parte de las veces no se presentan y no hay daños o efectos secundarios. A veces no es así: Es importante que Ud. conozca los riesgos:

Molestias locales en sitio de punción

Mareos o lipotimias

Punción de duramadre o raíces nerviosas

Reacción alérgica a fármaco severa o leve. (puede llegar a provocar paro cardiorespiratorio).

Infección

Reaparición del dolor a los días, semanas o meses

No tener ningún efecto analgésico

El procedimiento debe ser evitado en: embarazadas, diabetes descompensada o paciente con cuadro infeccioso.

FIRMA: _____

**RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE
Y QUEREMOS DARLE EL MEJOR
CUIDADO, CONSULTE CON SU MÉDICO**