

CONSENTIMIENTO INSTALACIÓN SONDA URETERAL (DOBLE J)

1. Identificación y descripción del procedimiento

Es un procedimiento por el medio del cual, el médico urólogo, utilizando un endoscopio (cistoscopio) coloca un catéter interno en el uréter (conducto que va desde el riñón a la vejiga).

El procedimiento debe efectuarse después de verificar la ausencia de infección urinaria.

Se realiza habitualmente en forma ambulatoria y con anestesia local (gel anestésico en uretra) que minimiza las molestias y las hace tolerables.

El procedimiento está indicado para resolver problemas de obstrucción del uréter

2. Objetivo del procedimiento y beneficio

Drenar adecuadamente el riñón.

3. Alternativas razonable de dicho procedimiento

Existen otras alternativas como la cirugía abierta o el drenaje percutáneo del riñón, el urólogo le explicará porque eligió este procedimiento para usted.

4. Consecuencias previsibles de su realización

Permitir el drenaje adecuado del riñón a través de la desobstrucción del uréter.

5. Consecuencias previsibles de su no realización

En su situación actual, el médico urólogo considera la presente indicación como la mejor opción entre las posibles.

En caso de no aceptar la presente indicación debe saber que existe una elevada probabilidad de persistencia y/o progresión de la sintomatología por la cual consultó.

6. Riesgos

De dicha intervención es posible pero no frecuente esperar los siguientes efectos secundarios o complicaciones:

- Hemorragia, tanto durante el acto como después. Las consecuencias de dicha hemorragia pueden ser muy diversas.
- Infección urinaria o general de consecuencias imprevisibles.
Perforación ureteral con riesgo de sangrado, infección, reabsorción de líquidos, todas ellas de consecuencias imprevisibles, que pueden precisar de un nuevo procedimiento o intervención.

7. Riesgos en función de la situación clínica del paciente

Es necesario que nos informe sobre el uso de aspirina, anticoagulantes o antiinflamatorios, así como las posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, renales, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia que pudiera complicar el procedimiento.

Por su situación actual (diabetes, obesidad, inmunodepresión, hipertensión, anemia, edad avanzada, etc.) puede aumentar la frecuencia o gravedad de riesgos o complicaciones, por lo que el riesgo del procedimiento en general es mayor.

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO, CONSULTE CON SU MÉDICO