

## CONSENTIMIENTO INSTILACIÓN VESICAL CON MITOMICINA

### 1. Identificación y descripción del procedimiento

Es un procedimiento que consiste en colocarle un medicamento llamado Mitomicina (quimioterápico local) dentro de la vejiga, a través de una sonda que se introduce por la uretra.

Este procedimiento se realiza en una o varias oportunidades, la cantidad y frecuencia le serán precisadas por su urólogo. Pueden ser propuestos dos esquemas de tratamiento eventualmente asociados:

- Instilación vesical única después de la operación;
- Serie de varias instilaciones después de la resección de la vejiga.

En el segundo caso las instilaciones solo se realizarán después de verificar que no exista infección urinaria.

Se realiza en forma ambulatoria y con anestesia local (gel anestésico en uretra) que minimiza las molestias y las hace tolerables.

### 2. Objetivo del procedimiento y beneficios

Eliminar una eventual enfermedad residual microscópica que originaría recurrencias de su enfermedad

### 3. Alternativas razonable de dicho procedimiento

Pueden ser utilizados otros productos, especialmente el BCG, su médico urólogo le explicará por qué optó por este tratamiento.

### 4. Consecuencias previsibles de su realización

Evitar la recurrencia y en algunos casos, la progresión de tumores a las capas más profundas de la vejiga.

### 5. Consecuencias previsibles de su no realización

En su situación actual, el médico urólogo considera la presente indicación como la mejor opción entre las posibles.

En caso de no aceptar la presente indicación debe saber que existe una elevada probabilidad de persistencia y/o progresión de la sintomatología por la cual consulto.

### 6. Posibles signos y síntomas post procedimiento

- Fatiga.
- Sensación de ardor vesical, a veces asociada a una infección urinaria.

### 7. Riesgos y complicaciones post procedimiento

De dicho procedimiento es posible, pero no frecuente esperar las siguientes complicaciones:

- Infección urinaria
- Infección de los órganos genitales en el hombre
- Alergia cutánea en los lugares que hayan podido entrar en contacto con la orina.
- Estrechez uretral consecutiva a los sondeos vesicales.

### **8. Riesgos y complicaciones post procedimiento**

De dicho procedimiento es posible, pero no frecuente esperar las siguientes complicaciones:

- Infección urinaria
- Infección de los órganos genitales en el hombre
- Alergia cutánea en los lugares que hayan podido entrar en contacto con la orina
- Estrechez uretral consecutiva a los sondeos vesicales.

### **9. Riesgos en función de la situación clínica del paciente**

Es necesario que nos informe sobre el uso de aspirina, anticoagulantes o antiinflamatorios, así como las posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, renales, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia que pudiera complicar el procedimiento. Por su situación actual (diabetes, obesidad, inmunodepresión, hipertensión, anemia, edad avanzada, etc.) puede aumentar la frecuencia o gravedad de riesgos o complicaciones, por lo que el riesgo del procedimiento en general es mayor.