

GENERALIDADES Y RIESGOS DE DERMOLIPECTOMIA CRURAL Y GLÚTEO

Información sobre la dermolipectomía crural y sus riesgos.

Dermolipectomía crural es un procedimiento quirúrgico dirigido a mejorar la forma y tersura de las piernas, que consiste en extirpar el exceso de piel y grasa de la parte interna del muslo, a la altura de la ingle, o, menos frecuentemente, de la parte lateral del mismo, a la altura de la cadera.

Traicionando de la piel tanto en sentido superior como medial podemos dar más tersura a la piel distendida del muslo y elevar el tejido descolgado.

La incisión en este tipo de cirugía se realiza en la cara interna del muslo, próximo a la ingle y en determinados casos puede requerir extenderla hasta el pliegue glúteo. En determinados pacientes la incisión puede ser circular, cuando se trata de lifting de muslos y glúteo, tratándose en todos los casos de que las cicatrices sean lo menos visibles posible. Es eso justamente lo que lleva a que las incisiones se realicen en la zona del pliegue inguinal o en el pliegue glúteo.

Una vez realizada la misma se lleva a cabo una liposucción y se eliminan los excesos de piel, finalizado lo cual se realizan las correspondientes suturas. Luego de la cirugía los pacientes deberán tolerar algunos tubos de drenaje por algunos días. Este procedimiento demanda aproximadamente entre 2 y 3 horas y posteriormente las piernas son vendadas por otros 2 o 4 días para favorecer la cicatrización.

RIESGOS

Existen como en toda cirugía, minimizados por el hecho de ser programada, con todas las precauciones del caso. Puede haber **hematomas y seromas** que remiten espontáneamente, requieren tratamiento de urgencia ó transfusión sanguínea. **La infección de herida o formación de abscesos**, que se pueden evitar si se toman los antibióticos indicados y se realizan las medidas higiénicas y las curas con el debido esmero. Por la ubicación de los cortes y su proximidad con los pliegues de la ingle, los genitales y el ano hay que ser particularmente cuidadosos. Puede haber **apertura de la herida o retraso en la cicatrización**. Algunas zonas de la incisión pueden no cicatrizar normalmente, y pueden tardar bastante tiempo en curar. **Cambios en la sensibilidad cutánea**, puede ocurrir disminución (o pérdida) de sensibilidad en la zona interna de los muslos que puede no recuperarse del todo posterior al procedimiento. Durante algunos meses **la cicatriz puede estar deprimida y de aspecto desagradable**. **Los fumadores tienen un mayor riesgo de pérdida cutánea y de complicaciones en la cicatrización**. **Puede haber también deformidad de los labios mayores** que puede ser secundaria a la tracción de la piel por el proceso de cicatrización en la región crural

He leído, comprendido y firmado el folleto informativo que se adjunta a consentimiento informado: "**Generalidades y riesgos de dermolipectomía crural y glúteo**"

Fecha_____

Firma del paciente_____

**RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y
QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO,
CONSULTE CON SU MÉDICO**