

Mastectomía Radical en Cáncer de Mama

Introducción

Mediante este procedimiento se extirpará la mama (tejido mamario, piel, areola y pezón), puede incluirse la obtención de ganglios de la axila de ese lado y/o también el músculo bajo el tejido mamario, según lo conversado previamente con su cirujano respecto al diagnóstico preoperatorio. La cirugía se realiza a través de una incisión alrededor de la mama, en el caso de necesitar obtener ganglios axilares se realiza, en algunas oportunidades, otra incisión en el vértice axilar. Durante la intervención la muestra es enviada como biopsia intraoperatoria para verificar que los márgenes se encuentren libres de enfermedad, el procedimiento quirúrgico puede variar según el informe para proporcionar el tratamiento más adecuado o en caso de algún hallazgo intraoperatorio. Las muestras obtenidas son enviadas a un completo estudio histológico en diferido.

La intervención requiere de anestesia general, eventualmente puede ser necesario el uso de hemoderivados. Los riesgos serán informados por los servicios respectivos.

Objetivos

1. Este procedimiento pretende la extirpación de la mama con el fin de lograr la curación de la enfermedad, o en algunos casos la paliación de síntomas secundarios.
2. En casos específicos obtener ganglios axilares para etapificar la enfermedad, lo que permite establecer tratamientos adyuvantes.

Alternativas Quirúrgicas

Para este diagnóstico la cirugía es la alternativa terapéutica más eficaz, sin embargo, para mejorar su eficacia se debe someter a los tratamientos post-quirúrgicos especificados en su caso. En algunas ocasiones la intervención se realiza luego de una quimioterapia, radioterapia u hormonoterapia.

Consecuencias previsibles de su realización

Lograr la curación de la enfermedad, o en algunos casos la paliación de síntomas secundarios.

Consecuencias previsibles de la no realización

Al no realizar la intervención la lesión puede progresar aumentando de tamaño comprometiendo así estructuras vecinas y lejanas, deteriorando al paciente y su calidad de vida, incluso con tendencia hacia la muerte.

Riesgos Frecuentes

A pesar de la adecuada elección y realización de la técnica pueden presentarse complicaciones, algunas comunes a toda intervención quirúrgica y otras específicas del procedimiento, como por ejemplo infección de la herida operatoria, dehiscencia, sangrado leve o importante, hematomas, seromas, alteración de la forma de la mama, flebitis, edema del brazo, dificultad transitoria en la movilidad del brazo, alteraciones de la sensibilidad en relación a las heridas operatorias, cicatrices, dolor, etc.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico o pequeños procedimientos quirúrgicos, pero pueden llegar a requerir de una reintervención, en ocasiones de urgencia.

Muy excepcionalmente la intervención quirúrgica puede estar asociada a mortalidad.

De cualquier forma, si hubiera una complicación debe saber que todos los medios humanos y técnicos de este hospital, están disponibles para intentar solucionarla.

En algunos casos, pese a todos los esfuerzos la enfermedad puede recidivar.

Riesgos en Función de la Situación Clínica Personal del Paciente

Es obligatorio, por parte del paciente, advertir de sus posibles alergias a medicamentos, alteraciones de la coagulación, enfermedades, existencia de prótesis mamaria, marcapasos, medicamentos en uso actual o cualquier otra circunstancia.

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO, CONSULTE CON SU MÉDICO