

Secuela Post-Operatoria

Introducción

Mediante la siguiente intervención se intentará resolver de la mejor manera posible una secuela secundaria a uno o varios procedimientos anteriores. El objetivo específico de la cirugía varía dependiendo de la situación, según lo explicado por su cirujano.

Este procedimiento requiere de anestesia general, eventualmente puede ser necesario el uso de hemoderivados. Los riesgos serán informados por los servicios respectivos.

Objetivos

1. Resolver de la mejor manera posible una secuela secundaria a uno o varios procedimientos quirúrgicos anteriores.
2. Control del cuadro clínico secundario.

Alternativas Quirúrgicas

En el caso específico no existe otra alternativa eficaz.

Consecuencias previsibles de su realización

Lograr el control clínico y quirúrgico de la secuela.

Consecuencias previsibles de la no realización

Según el tipo de secuela las consecuencias pueden variar ampliamente. En algunos casos específicos estas secuelas pueden poner en riesgo la vida del paciente de no mediar una intervención.

Riesgos Frecuentes

A pesar de la adecuada elección y realización de la técnica pueden presentarse complicaciones, algunas comunes a toda intervención quirúrgica y otras específicas del procedimiento, como por ejemplo infección de la herida operatoria, dehiscencia, sangrado leve o importante, hematomas, seromas, alteración de la forma de la mama, retracción del pezón, alteración de la sensibilidad en relación a la herida operatoria, cicatrices, dolor, etc.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico o pequeños procedimientos quirúrgicos, pero pueden llegar a requerir de una o varias reintervenciones, en ocasiones de urgencia.

Muy excepcionalmente la intervención quirúrgica puede estar asociada a mortalidad.

De cualquier forma, si hubiera una complicación debe saber que todos los medios humanos y técnicos de este hospital, están disponibles para intentar solucionarla.

Riesgos en Función de la Situación Clínica Personal del Paciente

Es obligatorio, por parte del paciente, advertir de sus posibles alergias a medicamentos, alteraciones de la coagulación, enfermedades, existencia de prótesis mamaria, marcapasos, medicamentos en uso actual o cualquier otra circunstancia.