

Consentimiento Informado para Fisura Anal

La fisura anal es una erosión (herida) del canal anal (defecación).

El tratamiento consiste en una resección de la zona lesionada más una sección o corte parcial del esfínter anal (esfinterotomía), con lo que se consigue disminuir la contracción del músculo de la zona y así permitir que cicatrice la lesión.

Cabe la posibilidad que durante la operación se deba realizar procedimientos adicionales para proporcionar el tratamiento más adecuado.

El objetivo de la cirugía es curativo, resolver el dolor, y permitir que cierre la fisura. Habitualmente se hace con anestesia regional, que le explicará el anesthesiólogo.

Luego del procedimiento las molestias pasan gradualmente y la zona cicatrizará en un periodo variable de tiempo, sin embargo.

Las complicaciones generales de esta intervención son las comunes a toda intervención quirúrgica, algunas complicaciones específicas son: sangrado e infección de la herida, absceso local, edema en la región perianal, dolor prolongado. Existen también riesgos poco frecuentes como: infección importante del periné, incontinencia de gases e incluso de deposiciones, estenosis anal o recidiva de la fisura. Estas complicaciones generalmente se resuelven con tratamiento médico, sin embargo en algunas oportunidades es necesario reintervenir.

Si usted tiene una enfermedad crónica, pueden ocurrir complicaciones propias de su estado general y enfermedades asociadas. Su médico le recomendará lo más adecuado en su caso particular.

Existen tratamientos alternativos, como el manejo médico, dietético o la infiltración de sustancias en el esfínter anal, pero la mayoría de estos procedimientos tienen una alta probabilidad de recidiva.

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO, CONSULTE CON SU MÉDICO