

## CONIZACION CERVIX UTERINO

El cuello uterino es la parte inferior del útero que conecta con la vagina.

Este procedimiento quirúrgico permite tratar lesiones preinvasoras del cuello uterino y en algunos casos diagnosticar cáncer de cérvix.

Es realizado por vía vaginal y presenta una baja frecuencia de complicaciones. Consiste en retirar la parte inferior del cérvix en forma de cono, utilizando un bisturí o a través de un procedimiento electro quirúrgico, el cual ocupa calor.

Puede ser realizado bajo anestesia local, regional o general, dependiendo del criterio del equipo médico. Se administrarán medicamentos para el dolor post-operatorio.

Una vez anestesiada la paciente, el médico introducirá un espéculo en la vagina para ver mejor el cuello uterino y realizar el procedimiento. El tejido extraído es enviado a estudio (biopsia).

Habitualmente requiere una hospitalización abreviada, dependiendo de los antecedentes de cada paciente. La mayoría de las veces podrá ser dada de alta el mismo día, de acuerdo a la indicación médica.

Después del procedimiento, durante las primeras 2-3 semanas puede haber pérdida de flujo o incluso un sangrado moderado.

Se debe evitar el uso de tampones, duchas vaginales. Abstinencia sexual por un mes.

Los riesgos del procedimiento pueden ser:

- Sangrado genital.
- Infección.
- Lesión de vejiga o recto.
- En futuros embarazos puede aumentar el riesgo de:
  - Parto prematuro (poco frecuente).
  - Rotura prematura de membranas (poco frecuente).

**RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO, CONSULTE CON SU MÉDICO**