

SIALOGRAFIA

Examen realizado mediante el uso de equipo de Rayos X que disponga de radioscopia para visualizar las estructuras contrastadas durante el examen y poder obtener adecuadas placas para el posterior informe radiológico. Este examen se realiza para estudio de patología de glándulas salivales y descartar litiasis, lesiones de conductos y patología inflamatoria o tumoral de las glándulas. Se canula el conducto principal y se inyecta contraste yodado. Esta inyección puede producir una leve molestia debido a la distensión del conducto.

El examen demora aproximadamente 30 minutos. El paciente debe concurrir al Servicio de Rayos en la hora indicada.

Como estudio alternativo para evaluar patología de las glándulas salivales existen la ecotomografía y la tomografía computada.

El medio de contraste yodado puede producir cuadros alérgicos que en el caso nuestro están reducidos por el uso de contraste no iónico. Los problemas alérgicos pueden ir desde una simple picazón o rush cutáneo hasta problemas mayores que pueden requerir hospitalización. Esta posibilidad es difícil que ocurra en pacientes sin antecedentes previos pero de ocurrir es de una frecuencia muy despreciable (menos del 1%).

En caso de paciente del sexo femenino no debe haber embarazo en curso para poder realizar este estudio.

Este examen debe ser autorizado por Ud. como paciente y debe firmar el consentimiento informado que se adjunta.