



Consentimiento Informado Infiltraciones

Su médico le ha indicado una infiltración con fármaco anestésico, corticoide, traumeel u otro.

Es importante que Ud. participe en su proceso de atención en salud. Para ello, informamos a Ud. los posibles efecto y riesgos de dichos fármacos o las infiltraciones articulares o en partes blandas.

El objetivo del procedimiento es aliviar o suprimir totalmente el dolor que le afecta, mejorar la funcionalidad de su sistema músculo esquelético, acelerar la recuperación de un proceso inflamatorio, disminuir la necesidad de otros tratamiento más prolongados con fármacos orales o eventualmente quirúrgicos o sus efectos secundarios.

En este procedimiento generalmente se utiliza anestesia local en el sitio de punción. Es importante que Ud. mencione si ha presentado alergia a algún tipo de fármacos, previamente.

¿En qué consiste el tratamiento? Esto consiste en introducir un anestésico local, mas el fármaco específico en alguna parte del cuerpo (articulaciones) definida por su médico tratante, de acuerdo a su historia clínica. Esto muchas veces sirve como un elemento diagnóstico y terapéutico a la vez. El objetivo es tratar un proceso inflamatorio, lesión quística o de partes blandas o en el hueso (articulaciones).

Es posible que se produzca más dolor, como consecuencia de la infiltración por un periodo. Consulte a su médico si requiere analgesia oral asociada en los días siguientes.

A pesar de la adecuada selección de la técnica y su correcta realización se puede presentar efectos secundarios indeseables. Ningún procedimiento médico está exento de riesgos, incluyendo la mortalidad o la posibilidad de lesionar otros órganos. Así hay riesgos comunes a toda intervención que pueden afectar todos los órganos o sistemas, incluyendo el riesgo vital, como otros específicos del procedimiento, tales como:

- Lesión de vasos sanguíneos, nervios, tendones adyacentes al sitio de punción.
- Hematomas o equimosis en la zona.

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO, CONSULTE CON SU MÉDICO

- Infección del sitio de punción (partes blandas o articular), que puede requerir tratamiento antibiótico, hospitalización, cirugía incluso (aunque rara vez).
- Irritación de la zona o articulación generando más aumento de volumen y mayor dolor.
- Reacción alérgica a la anestesia o fármaco indicado o baja de presión arterial que puede provocar una pérdida de conciencia.
- Dolor en la zona de inyección los primeras horas o días. Si es intraarticular puede provocarse un mayor aumento de volumen y dolor.
- También se puede descompensar una diabetes, hipertensión o úlcera gastroduodenal.

Es importante que sepa que estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (fármacos, sueros, etc.) o rehabilitación, pero pueden llegar a requerir hospitalización o incluso intervenciones quirúrgicas.

Ud. debe advertir a su médico posibles alergias a medicamentos, alteraciones de la coagulación, uso de fármacos anticoagulantes, enfermedades al corazón o pulmón, si es portador de una prótesis, marcapasos y los fármacos que utiliza actualmente.

**RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y
QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO,
CONSULTE CON SU MÉDICO**