

## **TRATAMIENTO DE OSTEOCONDROMAS**

Los osteocondromas son tumores benignos frecuentes. Generalmente el paciente consulta por efectos mecánicos, cosmética, compresión neurovascular, formación de pseudoaneurismas, fractura o transformación maligna.

En el caso de la Osteocondromatosis múltiple, los tumores tienen similar morfología y localización que los osteocondromas pero tienen un riesgo de transformación maligna que va entre 1 a 2% pero que en algunas series ha llegado a un 8%.

El tratamiento de los osteocondromas debe ser orientado individualmente. La decisión es de elección en aquellas lesiones sintomáticas. Su médico tratante ha indicado que usted debe someterse a este tipo de intervención, la cual consiste en la resección parcial o completa del tumor y posterior estudio con biopsia.

Existe la posibilidad que en la intervención quirúrgica se deba realizar una modificación de lo planificado, por los hallazgos intraoperatorios o calidad del hueso, para proporcionar un tratamiento más adecuado.

### **Riesgos de la Cirugía:**

Toda intervención quirúrgica puede tener efectos adversos, tanto por la propia técnica operatoria, como con la enfermedad asociada del paciente.

- En pacientes con esqueleto inmaduro puede producir un crecimiento mayor de la lesión, deformidad plástica del hueso o de la articulación adyacente por daño del cartílago de crecimiento.
- Infección herida operatoria que puede afectar el tejido óseo.
- Hematoma.
- Recurrencia del tumor, aproximadamente en 2% de los casos.
- Lesión nerviosa con la consiguiente parálisis o trastorno sensitivo o dolor crónico.
- Lesión vascular, la cual si es grave e irreparable puede determinar la necesidad de amputación. Si provocase Hemorragia masiva, en algunos casos, puede ocasionar la muerte.
- Rotura o fractura o estallido del hueso que se manipula durante la intervención.
- Flebitis o trombosis profunda que puede complicarse con embolias adyacentes.
- Rigidez articular o pérdida de movilidad y fuerza en extremidad operada.
- Necrosis cutánea.
- Síndrome compartimental que puede requerir cirugía o dejar secuelas tales como dolor crónico, lesión muscular, rigidez, necrosis de la piel, cicatrices y/o discapacidad.

**RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y  
QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO,  
CONSULTE CON SU MÉDICO**