

RETIRO ELEMENTOS OSTEOSINTESIS

Ud. ha sido informado por su médico tratante de la necesidad de realizar el retiro de los elementos de osteosíntesis.

Esto puede ser tornillos, placas, agujas, clavos endomedulares, tutor externo schanz, alambres. Su médico le habrá informado que a veces se retiran todos o solo algunos.

Para ello, generalmente, son necesarias incisiones en la piel, únicas o múltiples que a veces son muy similares a las de la cirugía original o se pueden agregar otras. Ocasionalmente no es factible el retiro de los elementos de osteosíntesis por dificultades técnicas o fractura de ellos al realizarlo.

Excepcionalmente en forma accidental pueden ocurrir fracturas en las mismas zonas en las semanas siguientes, por ello debe tomar los resguardos necesarios para evitar lesiones, golpes caídas en los meses siguientes. También puede ocurrir una fractura durante el procedimiento que obligue a colocar otros elementos de osteosíntesis en forma inmediata. Para realizar este procedimiento se requiere, a veces, el uso de radiografía portátil en pabellón.

Los riesgos generales son los mismos que en cualquier cirugía: Infección, trombosis, dolor residual, reoperación por fractura intraoperatoria o postoperatoria mediata o tardía, cicatriz queloidea o hipertrofica, enfermedad de Suddeck o síndrome de dolor regional complejo.