

CONSENTIMIENTO INSTILACIÓN VESICAL CON BCG

1. Identificación y descripción del procedimiento

Es un procedimiento que consiste en colocarle un medicamento llamado BCG (bacilo de Calmette y Guérin) dentro de la vejiga, a través de una sonda que se introduce por la uretra. Este procedimiento se realiza en una o varias oportunidades, la cantidad y frecuencia le serán precisadas por su urólogo. El tratamiento debe comenzar como mínimo quince días después de la resección endoscópica del tumor, cuando ya no exista hemorragia y después de verificar la ausencia de infección urinaria antes de cada instilación. Se realiza en forma ambulatoria y con anestesia local (gel anestésico en uretra) que minimiza las molestias y las hace tolerables.

2. Objetivo del procedimiento y beneficios

Desencadenar una reacción inflamatoria e inmunitaria local, destinada a evitar que se desarrolle un nuevo tumor y en algunos casos, suprimir ciertos tumores superficiales.

3. Alternativas razonables de dicho procedimiento

Pueden ser utilizados otros productos, mejor tolerados pero menos eficaces

4. Consecuencias previsibles de su realización

Evitar la recurrencia y en algunos casos, la progresión de tumores a las capas más profundas de la vejiga.

5. Consecuencias previsibles de su no realización

En su situación actual, el médico urólogo considera la presente indicación como la mejor opción entre las posibles.

En caso de no aceptar la presente indicación debe saber que existe una elevada probabilidad de persistencia y/o progresión de la sintomatología por la cual consulto.

6. Posibles signos y síntomas post procedimiento

- Fatiga.
- Sensación de ardor vesical.
- Fiebre transitoria.
- Hematuria (orinar con sangre).
- Náuseas y vómitos.

7. Riesgos y complicaciones post procedimiento

De dicho procedimiento es posible, pero no frecuente esperar las siguientes complicaciones:

- Fiebre por sobre los 38.5° C., en forma persistente
- Persistencia de hematuria y malestar general por más de 48 horas
- Infección de los órganos genitales en el hombre
- Alergia al medicamento
- Infección del riñón, hígado, de los pulmones o de una articulación

8. Riesgos en función de la situación clínica del paciente

Es necesario que nos informe sobre el uso de aspirina, anticoagulantes o antiinflamatorios, así como las posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, renales, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia que pudiera complicar el procedimiento. Por su situación actual (diabetes, obesidad, inmunodepresión, hipertensión, anemia, edad avanzada, etc.) puede aumentar la frecuencia o gravedad de riesgos o complicaciones, por lo que el riesgo del procedimiento en general es mayor.