HOSPITAL CLINICO FUSAT

Descripción de procedimiento CAPSULOTIMIA POSTERIOR CON LASER

Este procedimiento se realiza cuando, meses o años después de una cirugía de catarata exitosa, la membrana fina que sostiene el lente intraocular (la cápsula posterior) se opacifica, una condición conocida como **opacificación de la cápsula posterior (OCP)**.

Objetivo del Procedimiento

El objetivo principal de la capsulotomía con láser es crear una abertura clara en el centro de la cápsula posterior opacificada que está detrás del lente intraocular.

- Finalidad: Eliminar la obstrucción para que la luz pueda volver a enfocar correctamente en la retina.

Beneficios del Procedimiento

Los beneficios de una capsulotomía exitosa son rápidos y significativos:

- Mejora de la Visión: El beneficio más importante es el rápido retorno a la claridad visual que se había perdido debido a la OCP.
- Eliminación del Resplandor/Halos: Reduce la percepción de resplandor, halos y destellos que a menudo se experimentan con la OCP.
- Restauración de la Calidad de Vida: Permite al paciente volver a realizar actividades cotidianas como conducir, leer y ver televisión con mayor facilidad.
- Procedimiento Rápido y Ambulatorio: Es un procedimiento no invasivo, indoloro (se usan gotas anestésicas), y que se realiza en el consultorio en pocos minutos.

Posibles Complicaciones

Aunque es un procedimiento muy seguro y de rutina, como cualquier intervención médica, existen riesgos potenciales, aunque raros:

Complicación	Descripción	Manejo/Impacto
Aumento de la Presión Intraocular (PIO)	La presión dentro del ojo puede aumentar temporalmente.	Generalmente se maneja con gotas para bajar la presión antes o después del procedimiento.
Edema Macular Cistoide (EMC)	Hinchazón en el centro de la retina (la mácula).	Es raro y generalmente tratable con medicamentos antiinflamatorios.
Desprendimiento de Retina	Una complicación muy rara, donde la retina se separa de su tejido de soporte.	Requiere atención médica inmediata y, a menudo, cirugía para repararse.
Daño al lente Intraocular (LIO)	Muy infrecuente, pero el láser podría causar un pequeño "piquete" en la superficie del LIO.	Por lo general, no afecta la visión de manera significativa.
Inflamación Ocular	Enrojecimiento o sensibilidad temporal en el ojo.	Se trata con gotas oftálmicas antiinflamatorias.

Importante: La mayoría de las personas no experimentan ninguna complicación, y los riesgos son generalmente superados por los beneficios de restaurar la visión clara.